

Minimalinvasive Chirurgie

Durch die Methoden der Endoskopie (sog. Schlüsselloch-Behandlung) können Eingriffe schonend und gleichzeitig effizient durchgeführt werden. Dies ermöglicht bei Erkrankungen von Gebärmutter, Eileitern und Eierstöcken organerhaltende Operationen mit kosmetisch günstigem Ergebnis. Die Narben sind im Vergleich zur althergebrachten Bauchschnitt-OP um einiges kleiner und somit weniger sichtbar; nach der Operation sind Sie rasch wieder schmerzfrei.

Eine gesunde Gebärmutter ist eine wichtige Voraussetzung für die Einnistung einer Schwangerschaft. Myome, Polypen, Verwachsungen, Fehlbildungen oder andere Erkrankungen der Gebärmutter können rein mechanisch eine erfolgreiche Schwangerschaft verhindern oder auch das Risiko für eine Fehlgeburt erhöhen. Meistens ist es möglich, eine Erkrankung der Gebärmutter operativ zu beheben und dadurch die Voraussetzungen für eine gesunde Schwangerschaft wiederherzustellen. Zur weiterführenden Diagnostik und Therapie kann dann eine Gebärmutter Spiegelung (Hysteroskopie), eine endoskopische Untersuchungsmethode zur Darstellung und gleichzeitigen Behandlung der Gebärmutterhöhle, durchgeführt werden. Mit Hilfe kleinster Instrumente können in der Gebärmutter schonend Korrekturen vorgenommen, Gewebeproben entnommen oder die Eileiter katheterisiert werden.

Die Bauchspiegelung (Laparoskopie) ist ein Eingriff, der heutzutage primär zur Diagnose und Behandlung von Sterilitätsfaktoren im Bauchraum wie z. B. Verwachsungen, Endometriose und verschlossenen Eileitern eingesetzt wird. Hierbei werden einige (ca. drei bis vier) kleine Hautschnitte (ca. 0,3-10 mm Länge) in die Bauchwand gesetzt, durch die medizinische Instrumente in Bauch- und Beckenhöhle eingeführt werden können. Durch eine beleuchtete Kamera werden dann die Organe auf einem Bildschirm abgebildet. Während der Laparoskopie kann der Arzt beispielsweise Verwachsungen, Knoten und Zysten entfernen. Laparoskopien werden häufig bei wiederkehrender Endometriose eingesetzt, um die Fruchtbarkeit zu verbessern. Unsere Ärzte haben die Möglichkeit, solche Eingriffe an folgenden Orten für Sie durchzuführen.

Kliniken

- > Klinik Hirslanden - Belegarztstätigkeit Dr. Florian Götze & Dr. Helen Fontana
- > Spital Zollikerberg - Belegarztstätigkeit Dr. Helen Fontana
- > Privatklinik Bethanien - Belegarztstätigkeit Dr. Florian Götze